

Hlavní příčiny rakoviny

Hormonální antikoncepce

Rakovina prsu – „Po pěti letech užívání hormonálních preparátů hyperbolicky narůstá počet případů rakoviny prsou.“ (MUDr. Dušková, idnes.cz) „Zároveň dochází k mírnému nárůstu rizika rakoviny děložního čípku.“ (MUDr. Paseková)
Dále viz příbalové letáky k hormonální antikoncepci. **Alternativa:** Symptotermální metoda regulace početí je stejně spolehlivá a bez zdravotních rizik (např. www.lpp.cz). Dlouhodobé kojení snižuje pravděpodobnost výskytu rakoviny prsu.

Substituční terapie

Rakovina prsu – „Nasazení hormonální substituční léčby po menopauze zvyšuje riziko rakoviny prsu o 30%,“ (doc. Fínek, přednosta Onkologického a radioterapeutického odd., Plzeň, www.projekt35.cz)

Umělý potrat

Rakovina prsu, děložního hrdla, vaječnicků a jater – ženy po umělém potratu (i ze zdravotních důvodů) čelí relativně většímu riziku rakoviny než ženy, které potrat nepodstoupily. Zvýšené riziko má souvislost s násilným přerušáním hormonálních změn, které provázejí těhotenství. Riziko rakoviny prsu se po potratu zdvojnásobí a po dalších umělých potratech stoupá. **Nejlepší alternativa:** donosit dítě a to i v případě, že je nemocné – má tzv. vady neslučitelné se životem a během těhotenství nebo bezprostředně po porodu může zemřít.

Střídání partnerů

„Rakovina čípku je sexuálně přenosná nemoc způsobená různými druhy papilomavirů. Očkování není dostatečnou prevencí.“ (MUDr. Preiningerová, gynekoložka) **Jediná alternativa:** celoživotní věrnost jednomu partnerovi.

MÁTE PRÁVO VĚDĚT, JAK SE BRÁNIT RAKOVINĚ

Hlavní vlivy na vznik rakoviny:

- hormonální antikoncepce
- substituční terapie
- umělý potrat
- nevěra, střídání partnerů